

# Agersnegl


Latinsk navn: *Deroceras agreste*

Engelsk navn: Field slug

Klasse: Bløddyr

Orden: Lungesnegle

Familie: Agriolimacidae



**A**gersneglene lever ikke kun på marker, som man skulle tro efter deres navn. De findes især i løvskove og andre områder med tæt vegetation og god fugtighed. Agersneglene kommer mest frem om natten, hvor luftfugtigheden er størst.

## Kendetegn

Agersneglen er en lille snegl, som sjældent bliver længere end 3-4 cm. Agersneglene er grå, hvidlige eller brune.

## Føde

Agersneglene æder især friske plantedele, og de kan være til stor skade på marker og i gartnerier. I haverne ser vi ofte agersneglene i salat og andre grøntsager.

### Fakta

Levesteder: Skoven,  
Det åbne land  
Længde: 3-4 cm  
Parring: August-September  
Æg: Overvintrer  
Levealder: 1 år

### Vidste du det?

Agersneglene lægger deres æg, hvor de er godt beskyttede mod kulde. Hvis man graver i en kompostbunke om efteråret, kan man ofte støde på agersneglens æg, der er klare og ca. 2 mm i diameter.

# Iberisk skovsnegl

Latinsk navn: *Arion lusitanicus*

Engelsk navn: Lusitanian Slug

Klasse: Bløddyr

Orden: Lungesnegle

Familie: Skovsnegle



**D**en iberiske skovsnegl eller "dræbersneglen", var helt ukendt i Danmark indtil omkring 1990. Men sneglen blev indført fra Sydeuropa - sandsynligvis med biler, hvor den rejste med som "blind passager". Den iberiske skovsnegl har bredt sig hurtigt, fordi den er altædende og kan optræde i enorme mængder, hvor der er føde. Den spiser planter, svampe, samt døde dyr. Den spiser også sine egne artsfæller.

## Kendetegn

Den iberiske skovsnegl er 8-10 cm lang, dvs. noget mindre end både sort og rød skovsnegl. Den kendes især på sin sorte "maske" med sorte følehorn og en lysere stribe langs sålen. Iberiske skovsnegle optræder ofte i store flokke, og det er et meget sikkert tegn på, at det ikke er en rød skovsnegl, som oftest ses alene.

### Fakta

Levesteder: Skoven,  
Det åbne land  
Længde: 8-10 cm  
Levealder: 1 år  
Klækketid æg: 1-2 uger  
Ungetid: Overvintrer  
Kan tåle frost ned til -1½  
grad, men bliver det kol-  
dere, dør den.

### Vidste du det?

Den iberiske skovsnegl har en meget klæbrig slim på kroppen, og det er måske årsagen til, at der ikke er så mange dyr, der spiser de iberiske snegle. Slimen kan indeholde bakterier. Vask hænder grundigt, hvis du har rørt ved en iberisk skovsnegl.

# Rød skovsnegl


Latinsk navn: *Arion ater rufus*

Engelsk navn: Red slug

Klasse: Bløddyr

Orden: Lungesnegle

Familie: Skovsnegle



**D**en røde skovsnegl hører ikke oprindeligt til i den danske natur. Den blev bragt hertil i begyndelsen af 1900-tallet og findes nu spredt mange steder i Danmark, især i fugtige omgivelser langs skovvandløb og søer.

## Kendetegn

Den røde skovsnegl er en meget stor og buttet snegl. Farven kan variere fra mørk rød til gul orange. Sneglen kan forveksles med den iberiske skovsnegl, men den mangler en lysorange kant langs sålen, som hos den iberiske skovsnegl.

## Føde

Rød skovsnegl lever som mange andre snegle uden hus af grønne planter, visne planter, svampe og ekskrementer samt ådsler - også andre døde snegle.

### Fakta


Levesteder: Skoven  
Længde: Max 15-20 cm  
Parringstid:  
September-oktober  
Levetid: Max 2-3 år

### Vidste du det?

Rød skovsnegl er sandsynligvis blevet spredt i Danmark, fordi folk har fundet den flotte snegl og taget den med hjem i haven. De første røde skovsnegle, man kender til i Danmark, blev bragt til Silkeborg fra Tyskland i 1913.

# sort skovsnegl

Latinsk navn: *Arion ater*  
Engelsk navn: Great Black Slug  
Klasse: Bløddyr  
Orden: Lugesnegle  
Familie: Skovsnegle



**S**ort skovsnegl er almindelig udbredt i hele Danmark. Den findes i skove, i haver og på marker. Man ser flest sorte skovsnegle i fugtigt og lunt vejr - især om morgenen og om aftenen, hvor luftfugtigheden er størst. Når det er varmt og tørt, gemmer skovsneglene sig mellem visne blade eller på steder hvor der er skygge.

## Kendetegn

Sort skovsnegl er let at kende på grund af sin farve og den lange krop. Den kan ikke forveksles med andre snegle uden hus.

## Føde

Sort skovsnegl spiser både grønne planter, døde plantedele og svampe. Den spiser også døde dyr.

### Fakta

Levesteder: Skoven  
Længde: Længde: Max 12 cm  
Parringstid: August-oktober  
Max levealder: 1 år

### Vidste du det?

Sorte skovsnegle er som alle andre snegle både han og hun. Når to snegle har befrugtet hinanden, kan de begge lægge æg. De sorte skovsnegle dør om efteråret, men æggene klækkes næste forår. Ungerne er hvide, inden de bliver sorte.

# Lundsnegl

Latinsk navn: *Cepaea nemoralis*

Engelsk navn: Grove snail, Wood snail

Klasse: Bløddyr

Orden: Snegle

Familie: Lungesnegle



**L**undsnegl er en almindelig og meget udbredt snegl i Danmark. Den lever i lyse og åbne områder, skovbryn, skovlysninger, parker, haver, moser, grøfter, på enge og overdrev og langs vandløb. Lundsneglen kommer frem om natten eller i fugtigt vejr.

## Kendetegn

Lundsneglen er en mellemstor snegl med fladt, kugleformet hus og mørk skalåbning. Huset varierer i farve og tegning fra gullig til rødlig eller brunlig med eller uden mørke spiralbånd. Kroppen er grålig.

## Føde

Lundsnegle æder friske planter, planterester, alger og svampe. Sneglene rasper stykker af planter og alger af underlaget med tungen.

### Fakta

Levesteder: Det åbne land  
Husets højde: 12-22 mm  
Husets bredde: 18-25 mm  
Tvekønnet/hermafrodit  
Parring: Maj-juni  
Æg: 10-80  
Levealder: ca. 3 år


### Vidste du det?

Om efteråret går lundsnegle i vinterdvale. De graver sig ned i løv eller i jorden, trækker sig helt ind i huset og lukker skalmundingen med størknet slim og små, fine kalkstykker. Man ser derfor kun lundsneglen april-oktober.



# Havesnegl

Latinsk navn: *Cepaea hortensis*  
Engelsk navn: White-lipped snail  
Klasse: Bløddyr  
Orden: Lungesnegle  
Familie: Helicidae



**H**avesneglen lever trods sit navn ikke blot i haver men især i løvskove. Den er almindelig udbredt i hele landet, bortset fra områder med meget lidt kalk i jorden, fx på heder og i nåleskove. Havesneglen kan kun bygge sit hus, hvis den lever på kalkholdig jord.

## Kendetegn

Havesneglens hus varierer meget i farven fra brunt til rødt og gult. Huset kan være ensfarvet, eller det kan have 5 mørke bånd, som snor sig rundt om sneglehuset.

## Føde

Havesneglen er udelukkende planteæder. Den spiser både grønne plantedele og halvrådne planter.

### Fakta

Levesteder: Skoven,  
Det åbne land,  
Sø og vandløb  
Længde: Ca. 2 cm  
Hus diameter: Ca. 2 cm  
Levealder: Max 3 år  
Parring: Maj-juni

### Vidste du det?

Sent på efteråret går havesneglen i dvale. Den graver sig ned i en bunke løv og lukker sig inde i sit hus med flere lag af størknet slim, som danner et beskyttende låg. Næste forår vågner sneglen igen.

# Vinbjergsnegl

Latinsk navn: *Helix pomatia*

Engelsk navn: Edible snail

Klasse: Bløddyr

Orden: Lugesnegle

Familie: Helicidae



**V**inbjergsneglen er almindelig i det meste af Danmark. Man ved ikke, om den er indført hertil i middelalderen, eller om den forekommer naturligt. Vinbjergsneglen er vor største landsnegl med hus. Selv om vinbjergsneglen æder grønne planter, betragtes den ikke som et skadedyr.

## Kendetegn

Vinbjergsneglen kendes på sit store lysebrune hus, der kan blive op til 4 cm i diameter. Når sneglen kravler, ser man tydeligt de mange felter på kroppens overside.

## Føde

Vinbjergsnegle æder grønne planter og også blade, som er faldet af træerne, men ikke rådne plantedele.

### Fakta

Levesteder: Skoven,  
Det åbne land  
Længde: max 4,5 cm  
Parringstid: Maj  
Æg: 20-60  
Max levealder: 8-9 år

### Vidste du det?

Vinbjergsnegle spises som en stor delikatesse. Sneglene er først rensede og kogte. Måske har du smagt vinbjergsnegle. Vinbjergsnegle kan købes på dåse eller dybfrost. Ofte er sneglehusene med i pakkerne med snegle.

# Plettet voldsnegl


Latinsk navn: *Helix aspersa*

Engelsk navn: Brown Garden Snail

Klasse: Bløddyr

Orden: Lugesnegle

Familie: Helicidae



**P**lettet voldsnegl er blevet indført til Danmark, og den er ret sjælden her i landet. Sneglen lever på overdrev, enge, i parker og haver. Plettet voldsnegl er aktiv og søger føde om natten.

## Kendetegn

Plettet voldsnegl er en stor landsnegl. Sneglehuset er kugleformet og brunt eller gulligt med mørke spiralbånd og en stor, rund munding. Kroppen er mørk gulgrå, og sneglen har 2 par kølleformede tentakler.

## Føde

Sneglen æder forskellige plantedele, frugter, grønsager, urter og blomster. I flere lande opfatter man derfor plettet voldsnegl som et udbredt skadedyr i haver, på dyrkede marker og i frugtplantager.

### Fakta

Levesteder: Det åbne land  
Husets højde: 30-32 mm  
Husets bredde: 35-36 mm  
Tvekønnet/hermafrodit  
Parring: Maj-juli  
Æg: 30-120  
Levealder: Maks. 10 år

### Vidste du det?

Plettet voldsnegl er en fin spisesnegl, og den holdes ofte til spisebrug. Sneglen holdes dog også som væddeløbssnegl, da plettet voldsnegl er en ret hurtig snegl.



# Stor mosesnegl


Latinsk navn: *Lymnaea stagnalis*

Engelsk navn: Great pond snail

Klasse: Bløddyr

Orden: Lungesnegle

Familie: Mosesnegle



**S**tor mosesnegl er meget almindelig i Danmark, hvor den er udbredt i søer, damme, vandhuller og rolige vandløb. Sneglen foretrækker levesteder med mange vandplanter, og den findes ofte på sten og planter.

## Kendetegn

Stor mosesnegl har et spiralformet og meget spidst sneglehus med 6-8 vindinger. Huset er brunt eller gulligt. Munden er ca. halv så bred som husets højde. Stor mosesnegl er den største ferskvandssnegl i Danmark. Sneglene har især store sneglehuse, hvis de lever i søer med meget kalk.

## Føde

Stor mosesnegl lever af ådsler, alger og halvrådnede plantedele, som den rasper itu med sin tunge.

### Fakta

Levesteder: Sø og vandløb  
Husets højde: op til 6 cm.  
Husets brede: ca. 3 cm.  
Parring og æglægning: marts-september  
Stor mosesnegl er tvekønnet (hver snegl er både han og hun)  
Levealder: normalt ca. 1 år

### Vidste du det?

Stor mosesnegl er tvekønnet, hvilket vil sige, at hver enkelt snegl både producerer æg og sæd. Sneglen er dog stadig nødt til at parre sig med en anden snegl. Efter parringen lægger begge snegle æg i nogle 5-6 cm lange gelékapsler. Æggene klækkes efter 1-2 uger.

# Ravsnegl

Latinsk navn: *Succinea putris*

Engelsk navn: **Amber snail**

Klasse: **Bløddyr**

Orden: **Lungesnegle**

Familie: **Ravsnegle**



**R**avsneglen er almindeligt udbredt i hele Danmark, hvor den lever nær søer, vandhuller, damme, små vandløb og åer. Ravensneglen er en landsnegl, som lever på planter, men i tørt vejr findes den også på vandplanter nede i vandet. Ravensnegle forekommer ofte i store antal, og de er som regel meget aktive i vådt vejr.

## Kendetegn

Ravsneglen har et aflangt, ægformet hus, som er gyldenbrunt og glinsende - ligesom rav. Husets munding er ret bred, ca. 2/3 af højden. Kroppen er slimet, og den har brede følehorn.

## Føde

Ravsnegle bruger tungen til at raspe eller gnave planter i stykker. De lever udelukkende af græsser, blade og andre plantedele.

### Fakta

Levesteder: Sø og vandløb  
Husets højde: 15-22 mm  
Husets bredde: 7-12 mm  
Kan ses: April-november  
Ravsnegle er tvekønnede  
(hver snegl er både han og hun)

### Vidste du det?

Ravsnegle er ofte værter for en bestemt snyltende fladorm, der kaldes en ikte. Ikte-larver kan leve i ravsneglens følehorn, som svulmer meget op. Til sidst falder følehornene af, og ikten forlader ravsneglen. Ravensnegle med ikter vokser meget dårligt.

# Posthornsnegl


Latinsk navn: *Planorbarius corneus*

Engelsk navn: Great ramshorn

Klasse: Bløddyr

Orden: Lugesnegle

Familie: Skivesnegle



**P**osthornsneglen er almindeligt udbredt i størstedelen af Danmark, dog mangler den i det nordvestlige Jylland. Sneglen trives bedst i lune og lavvandede små søer, damme, vandhuller og grøfter med mange vandplanter. Posthornsneglen kan dog også forekomme i større søer og i rolige vandløb.

## Kendetegn

Posthornsneglen er den største af de danske skivesnegle, der alle har flade huse, hvor vindingerne ligger inden i hinanden fremfor at gå op i en spids. Posthornsneglens hus har ca. 5 vindinger og er posthorn-formet med en rund munding. Huset er brunligt.

## Føde

Posthornsnegle lever af alger, som de rasper eller skraber af sten og vandplanter.

### Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Husets diameter/højde: 35 mm

Husets bredde: Ca. 16 mm

Parring og æglægning: Forår-sommer

Posthornsnegle er tvekønnede (hver snegl er både han og hun)

Levealder: Ca. 2-3 år

### Vidste du det?

Posthornsneglen hører under gruppen af lugesnegle, som ånder med en slags lunge. Sneglen må derfor op til overfladen for at få luft. Om vinteren, når det er koldt, går sneglen i dvale nede på på bunden. I dvaleperioden behøver sneglen ikke at få ny luft.

# Almindelig konk

Latinsk navn: **Buccinum undatum**

Engelsk navn: Common whelk, Whelk, Buckie

Klasse: **Bløddyr**

Orden: **Neotaenioglossa**

Familie: **Konkyliesnegle**



**A**lmindelig konk kaldes også for konkylie eller konksnegl. Konken er almindelig i alle danske farvande indtil den vestlige del af Østersøen. Den lever på lavt, roligt vand ved kysterne og helst på sandet eller stenet bund. Konkylieene findes ofte opskyllet langs kysterne.

## Kendetegn

Almindelig konk er en af de største danske havsnegle. Skallen er spiralsnoet og grålig eller rødbrun med lilla markeringer og bulede ribber, der går på tværs af snoningen. Selve sneglen er hvidlig med sorte pletter.

## Føde

Konken er et rovdyr, der æder orme, krabber, muslinger, ådsler og fisk, der er skadede eller fanget i garn. Sneglen bruger sin udskydelige snabel og sin raspetunge, når den æder.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Længde: Op til 10 cm  
Ægkapsler, der lægges om sommeren

### Vidste du det?

Almindelig konk lægger æg i store gulhvide, klistrede klumper, der består af op til 15.000 linseformede ægkapsler. Hver ægkapsel indeholder mellem 500 og 3000 æg, hvoraf kun 3-5 bliver til små snegleunger. De øvrige æg ædes af de overlevende unger.



# Dværgkonk

Latinsk navn: *Hinia reticulata*

Engelsk navn: Netted dog whelk

Klasse: Bløddyr

Orden: Neotaenioglossa

Familie: Konkyliesnegle



**D**værgkonk er almindelig i alle danske farvande. Den er især meget talrig i fjordene. Sneglen lever normalt på lavt vand fra kysten og ud til ca. 10 meters dybde nedgravet i sand- eller mudderbunden.

## Kendetegn

Dværgkonkens hus er spiralsnoet, buttet og ret kompakt. Overfladen er bulet og netagtig. Nederst på huset er der en bred rende ved åbningen. Sneglehuset kan både være lyst, mørkt eller farvestrålende i gullige, rødlige og blåviolette farver.

## Føde

Dværgkonken lever især af ådsler som fx døde og halvrådne fisk og muslinger, som den kan lugte på stor afstand. Den æder også orme og andre smådyr.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Længde: Op til 3 cm  
Ægkapsler med 50-100 æg  
Ægtid: Ca. 4 uger  
Larvetid: 2-3 uger

### Vidste du det?

Dværgkonk lever ofte på lavt vand tæt ved kysten, og den er derfor meget almindelig i opskyl på vore strande.



# Almindelig strandsnegl

Latinsk navn: *Littorina littorea*

Engelsk navn: Common periwinkle, Edible winkle

Klasse: Bløddyr

Orden: Neotaenioglossa

Familie: Strandsnegle



**A**lmindelig strandsnegl findes ved de fleste danske kyster indtil den vestlige del af Østersøen. Sneglen lever normalt på sten og moler ved lavvandede kyster og strande i tidevandszonen. Sneglen er under vand ved højvande og over vand ved lavvande. Strandsneglene lægger ægkapsler frit i vandet.

## Kendetegn

Sneglehuset er ret tykt og kraftigt med et kort, topformet spir. Derudover er skallen mørk, grålig eller brun med tværgående striber og ofte også med små huller lavet af børsteorme.

## Føde

Strandsneglen lever af alger, som den rasper eller gnaver af sten med sin raspetunge. Tungen er stor og besat af hornagtige tænder.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 3,5 cm

Yngler: Forår

Ægkapsler: 200-5000

Larvetid: Ca. 3 uger

Max levealder: 4-10 år

### Vidste du det?

Almindelig strandsnegl kan ligesom andre havsnegle lukke munden til sneglehuset med et kalklåg, når de tørlægges. Dermed kan den almindelige strandsnegl overleve meget lang tid udtørring ved lavvande, når blot den bliver inde i huset med låget lukket.

# Huesnegl


Latinsk navn: *Ancylus fluviatilis*

Engelsk navn: River Limpet

Klasse: Bløddyr

Orden: Lungesnegle

Familie: Skivesnegle



**H**uesnegle er almindelige i rindende ferskvand, fx små vandløb og åer. Huesnegle kræver en del ilt, hvorfor de trives bedst i iltrigt og strømmende vand. De lægger deres æg i små, spiralformede kapsler. Huesneglene findes næsten overalt i Danmark.

## Kendetegn

Huesneglen kan kendes på sin hueformede skal, der er brunlig eller gråbrun. Munden er enten aflang eller rund. Sneglen har desuden en stor fod, så den kan holde sig fast i strømmende vand.

## Føde

Huesnegle lever af alger, som de rasper af overfladen på sten og planter med deres ru tunger.

### Fakta

Levesteder: Sø og vandløb  
Længde: 6-7 mm.

### Vidste du det?

Der findes to underformer af huesneglen. Den, der er omtalt på denne side, kaldes *ancylus*, og lever i strømmende vand. Den anden kaldes *acroloxus* og lever i mere stillestående vand.

# Pelikanfod

Latinsk navn: *Aporrhais pespelecani*

Engelsk navn: **Pelicans foot**

Klasse: **Bløddyr**

Orden: **Caenogastropoda**

Familie: **Pelikanfodsnegle**



**P**elikanfod eller pelikanfodsneglen er almindelig i Danmark, hvor den findes i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat indtil den nordlige Østersø. Sneglen lever normalt nedgravet i blød mudder- eller lerbund på 10-100 meters dybde.

## Kendetegn

Pelikanfodsneglen har et højt, spidst spir og en meget karakteristisk udvækst ved den smalle, langstrakte munding. Udvæksten ligner lidt en svømmefugls fod, hvilket har givet sneglen navn. Udvæksten mangler hos unge snegle. Skallen er meget solid og gullig, cremefarvet, rødlig eller lilla.

## Føde

Sneglen lever af kiselalger og dødt, organisk materiale (detritus), som den spiser direkte fra bunden.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Længde: op til 5 cm  
Bredde: op til 3 cm  
Parring: forår  
Æg: ?

### Vidste du det?

Pelikanfodssneglen lever nedgravet i havbunden, hvorfra den borer to kanaler op til overfladen, så der kan cirkulere vand igennem. Den optager ilt fra vandet og æder de alger og den detritus, der føres ned til den sammen med vandet.

# Tøffelsnegl

Latinsk navn: *Crepidula fornicata*

Engelsk navn: Slipper limpet

Klasse: Bløddyr

Orden: Mesogastropoda

Familie: Calyptraeidae



**Tøffelsneglen** er indslæbt til Europa og Danmark fra Nordamerika. Her i landet findes sneglen især i den vestlige del af Limfjorden samt mindre almindeligt i den østlige Limfjord, ved den jyske vestkyst og i den nordlige del af Kattegat. Tøffelsneglen sidder ofte på sten og østers, og de danner tit kæder af flere snegle oven på hinanden.

## Kendetegn

Tøffelsneglens skal er skæv hueformet og muslingeagtig med en brun og hvidlig overside. Skalåbningen dækkes halvt af en tynd, hvid skillevæg.

## Føde

Sneglen lever af plankton, som den filtrerer fra vandet. Dermed kan tøffelsneglen være en alvorlig næringskonkurrent til fx østers, der også lever af at filtrere vandet for plankton.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Længde: op til ca. 4-6 cm

### Vidste du det?

Tøffelsneglen er hermafrodit, idet den skifter køn fra han til hun med alderen. Hunnen udruger æggene under foden. Hunnerne er størst og er nederst i kæderne, som sneglene kan danne. Hanterne er mindst og øverst i kæderne.



# Tårnsnegl

Latinsk navn: *Turritella communis* Risso

Engelsk navn: Auger shell, Screw shell

Klasse: Bløddyr

Orden: Caenogastropoda

Familie: Tårnsnegle



**T**årnsneglen er almindelig og findes fra Nordsøen til Kattegat og den nordlige del af Østersøen. Sneglen lever nedgravet i blød mudderbund fra 10 meters dybde og udefter. Man kan finde opskyllede skaller fra tårnsneglen langs stranden.

## Kendetegn

Tårnsneglens skal er et spir eller tårn med 12-19 snoninger/vindinger. Skallen har desuden ribber eller striber, der følger vindingerne, og den er normalt gråbrun eller rødbrun. Åbningen ind i skallen er næsten helt cirkelrund.

## Føde

Sneglen æder fødepartikler og organisk materiale, som den filtrerer fra vandet - ligesom muslinger.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Længde: Op til 6 cm  
Æg og sæd gydes frit i vandet

### Vidste du det?

Tårnsneglen lever halvt nedgravet i havbunden, men den laver en form for fordybning, så vandet kan komme ned til sneglens gæller. Tårnsneglen optager ilt fra vandet, og filtrerer det samtidig for føde.