

Blishøne

Latinsk navn: **Fulica atra**

Engelsk navn: **Eurasian coot**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Traner**

Familie: **Vandhøns**



Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den findes nær søer og moser med en rig plantevækst. Blishønen er både en træk- og standfugl. Den kan ses hele året – også som vintergæst nordfra.

Kendetegn

Blishønen er en tæt bygget og tung vandhøne. Den har en sort/koksgrå fjerdragt bortset fra det hvide næb og den hvide pandeblis. Blishønen har desuden kraftige fødder og lange tæer.

Føde

Blishønsene finder både føde på land og nær rørskov. De kan dykke ned til et par meters dybde. Føden består især af vandplanter, skud af tagrør, småfisk, haletudser samt insekter og snegle.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Vingefang: 70-80 cm
Længde: 38 cm
Vægt (han): 750-900 g
Vægt (hun): 500-800 g
Maks. levealder: 20 år
Kuldstørrelse: 6-10 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 21-24 dage
Ungetid: 55-60 dage

Vidste du det?

Om foråret kæmper blishønsene om yngleterritorierne. Det foregår under støj, vingebasken og plasken, når de pisker efter hinanden i vandoverfladen. Blishønsene truer hinanden ved at sænke hovedet og løfte vingerne højt.

Ederfugl

Latinsk navn: *Somateria mollissima*

Engelsk navn: Common Eider

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder

Ederfuglen er almindeligt udbredt i Danmark, hvor man kan se fuglene i store flokke hele året, men især om vinteren. Der yngler ca. 25.000 par ederfugle langs de danske kyster og på småøer i de indre farvande. Ederfuglen kan dykke over 20 m efter føde, men den foretrækker dog at søge føde på ret lavt vand.

Kendetegn

Hannen har i yngletiden en kontrastrig sort og hvid fjerdragt, hvor pande og underside er sort, og oversiden og kinder er hvide. Hannens nakke er grønlig og brystet rødlig. Hunnen er brun med sorte pletter og en lys næbspids. Ederfugle har lange, trekantede næb.

Føde


Ederfugle lever af blåmuslinger, snegle, fisk og krebsdyr. Ungerne æder især tanglopper.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 80-110 cm
Længde: Ca. 58-60 cm
Vægt: 1200-2800 g
Max levealder: 37 år
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-28 dage
Ungetid: 65-75 dage

Vidste du det?

Om vinteren kommer flere tusinde ederfugle til Danmark for at overvintrere. Faktisk overvintrer ca. 1/4 af alle europæiske ederfugle i danske farvande. Fuglene raster i store flokke på havet i lavvandede områder nær muslingebanker, hvor vandet kun er 5-15 m dybt.



Fløjlsand

Latinsk navn: *Melanitta fusca*

Engelsk navn: Velvet scoter

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder

Fløjlsanden er meget almindelig i de indre danske farvande samt ved kyster og fjorde. Fløjlsanden yngler ikke i Danmark. Fuglene kommer til Danmark for at overvintre og trækker igen nordpå om foråret for at yngle. Fløjlsænderne lever ofte i meget store flokke.



Kendetegn

Hannen er helt sort med hvidt vingespejl og en hvid plet under øjet. Hannens næb er desuden gult og orange med en sort knop øverst. Benene er røde. Hunnen er helt brun med hvidt vingespejl og to lyse pletter på hovedet.

Føde

Fløjlsænderne lever af krebsdyr, småfisk og muslinger, som de dykker efter på forholdsvis dybt vand, et godt stykke fra kysten. Fløjlsænderne kan dykke 30 m ned efter føde.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 79-99 cm
Længde: 51-58 cm
Vægt: 1100-2000 g
Maks. levealder: 21 år
Kuldstørrelse: 7-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 50-55 dage

Vidste du det?

Der overvintre omkring 100.000 fløjlsænder i Danmark. Man kan dog allerede se ænderne i Danmark fra midten af august, hvor mange voksne fugle fælder deres fjer. Omkring 4.000 fløjlsænder fælder deres fjer her i landet.



Gravand

Latinsk navn: *Tadorna tadorna*

Engelsk navn: **Shelduck**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Andefugle**

Familie: **Svaner, gæs og ænder**

I Danmark er de fleste gravænder trækfugle. De kan dog ses hele året nær lavandende kyster eller ved søer og moser inde i landet – særlig mange gravænder overvintrer ved Vadehavet.

Kendetegn

Gravænder er store gåselignende fugle med broget fjerdrag. De kendes især på det rustbrune brystbånd, det røde næb og det mørkegrønne hoved. Hannen og hunnen ligner hinanden. Hunnen er dog mindre, og hannen har en større rød knop på næbbet.

Føde

Gravænder holder sammen i par, og de forsvare et bestemt yngleterritorium nær kysten eller søer. Deres føde består af muslinger, krebsdyr, insekter og planter.



Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 110-133 cm
Længde: 61 cm
Vægt: 1,1-1,45 kg
Max levealder: 24 år
Kuldstørrelse: 8-10 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-31 dage
Ungetid: 45-50 dage

Vidste du det?

Gravænder holder meget tæt sammen parvis. Modsat mange andre ænder passer både hannen og hunnen ungerne. Desuden flyver gravænderne ofte parvis. Hunnen, som er lidt mindre end hannen, flyver forrest.

Gråand


Latinsk navn: *Anas platyrhynchos*

Engelsk navn: Mallard

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder



Gråanden er den mest almindelige and i Danmark. Den yngler overalt i landet i nærheden af vand – altså både ved søer, moser, vandhuller, kysten og i parker. Større flokke af gråænder nordfra overvintrer i Danmark.

Kendetegn

I yngleperioden har andrikken et metalgrønt hoved og hals samt et rustbrunt bryst med en hvid halsring. Næbbet er gult. Anden har derimod en brunlig fjerdragt og et gulbrunt næb. Begge køn har blå vingespejl.

Føde

Gråænder er svømmeænder og finder derfor føde ved enten at snadre i vand-overfladen eller ved at dyppe hoved og hals ned i vandet. Føden består af frø, plantedele, skaldyr, insekter og brødrester.

Fakta

Levesteder: Sø og vand-løb, Kyst og hav
Vingefang: 81-98 cm
Længde: 58 cm
Vægt: 850-1400 g
Max levealder: 23 år
Kuldstørrelse: 9-13 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 50-60 dage

Vidste du det?

Når ællingerne udklækkes vil de i løbet af få timer være klar til at følge efter den første genstand, der bevæger sig bort fra den. I naturen er dette deres mor, men i forsøg har det vist sig, at det også kan være andre ting – fx et menneske.

Gråstrubet lappedykker


Latinsk navn: *Podiceps grisegena*

Engelsk navn: Red-necked grebe

Klasse: Fugle

Orden: Lappedykkere

Familie: Lappedykkere



Gråstrubet lappedykker ses over hele landet, men størstedelen af den danske bestand findes mod øst. Forekommer ved søer, moser, tørvegrave og andre vådområder med en rig vegetation. Almindelig trækfugl. Enkelte overvintrer ved de danske kyster.

Kendetegn

De gråstrubede lappedykkere har en brunsort ryg og en lys underside, mens halssenen er rødbrun. Det øverste af hovedet og fjerørene er sorte, hvorimod kinderne og struben er lysegrå. Basis af næbbet er gult, mens resten af næbbet er mørkt. De to køn er ens.

Føde

Gråstrubede lappedykkere spiser store vandinsekter, snegle, små padder, alger og andre vandplanter samt småfisk.

Fakta


Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav
Vingefang: 77-85 cm
Længde: 40-50 cm
Vægt: 700-900 g
Max levealder: ? år
Kuld størrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-25 dage
Ungetid: 72 dage

Vidste du det?

Den gråstrubede lappedykker er en sky fugl, som kun opholder sig ganske lidt på den fri vandoverflade. Reden er gemt mellem rør i vandkanten. Man kan være heldig at observere en gråstrubet lappedykker og høre dens kald i yngletiden. Det lyder næsten om som et grisehyl.

Hvinand

Latinsk navn: *Bucephala clangula*
Engelsk navn: Common goldeneye
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder



Hvinanden er vintergæst i Danmark og almindelig i hele landet i perioden oktober-april. Der er meget få ynglende par i Danmark. Hvinænderne holder til ved større søer, vandløb, kyster og fjorde.

Kendetegn

Hannen har en hvid fjerdragt med sort ryg og hale. Den har mørke undervinger og hvidt vingespejl. Hovedet er sort med et grønligt skær. Øjnene er gule. Ved næbroden sidder en karakteristisk hvid plet. Hunnen har brunt hoved og grå ryg, samt et gulligt næb. Begge køn har en kort hals og en høj pande.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 65-80 cm
Længde: 40-48 cm
Vægt (han): 820-1150 g
Vægt (hun): 600-900 g
Maks. levealder: 16 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-30 dage
Ungetid: 57-66 dage

Føde

Hvinanden er en dykand, der finder sin føde på bunden af søer og lavvandede fjorde. Den æder insekter, snegle, muslinger, småfisk og vandplanter.

Vidste du det?

Hvinanden har fået sit navn efter den hvinende lyd, som frembringes af vingeslagene.



Knopsvane

Latinsk navn: *Cygnus olor*

Engelsk navn: **Mute swan**

Klasse: **Fugle**


Orden: **Andefugle**

Familie: **Svaner, gæs og ænder**

Knopsvanen er Danmarks nationalfugl, og det er vor mest almindelige svane. Knopsvanen kan ses hele året. Den lever og yngler i søer, lavvandede fjorde og kyster, moser samt byparker. De danske svaner er standfugle. Store træk af knopsvaner nordfra overvintrer ved de danske kyster.

Kendetegn

Knopsvanen er en stor svømmefugl med hvid fjerdragt. Den lange hals er s-formet. Næbbet er orangerødt med sort basis og sort knop. Knoppen er mindre hos hunner end hos hanner. Hannernes knop er et statussymbol.



Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Kyst og hav
Vingefang: 208-240 cm
Længde: 145-162 cm
Vægt (han): 12 kg
Vægt (hun): 10 kg
Max levealder: 42 år
Kuldstørrelse: 5-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 34-38 dage
Ungetid: 120-150 dage

Føde

Knopsvanernes føde består mest af vandplanter og alger, som den finder på lavt vand ved at dykke halsen ned i vandet. Knopsvanerne spiser også græs og korn.

Vidste du det?

Knopsvanens unger er gråsorte og pjuskede. Først efter nogen tid får de forældrenes elegante holdning med den s-formede hals. Der går flere år, inden knopsvanerne får deres smukke, hvide fjerdragt.

Krikand


Latinsk navn: *Anas crecca*

Engelsk navn: **Common teal**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Andefugle**

Familie: **Svaner, gæs og ænder**



I Danmark yngler kun omkring 300 par **krikænder**, især ved næringsfattige søer og vandhuller. Til gengæld passerer store flokke af krikænder Danmark i trækperioden. Her ses de oftest ved lavvandede fjorde.

Kendetegn

Hannen har en grå fjerdragt og et rustbrunt hoved med en metalgrøn stribe gennem øjet med gul indramning. Gumpen er gul. Hunnen har en gråbrun fjerdragt. Begge køn har et grønt og sort vingespejl. Krikanden er den mindste and i Danmark.

Føde

Krikændernes føde består om vinteren af frø og vandplanter. Om sommeren består føden af krebsdyr, bløddyr og insekter, som ænderne finder ved at snadre med næbbet i muddret.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 58-64 cm
Længde: 34-38 cm
Vægt: 250-400 g
Maks. levealder: 21 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-23 dage
Ungetid: 25-30 dage

Vidste du det?

Når krikanden ligger i vandet og pludselig føler sig truet, reagerer den hurtigt. Den stryger lodret op i luften, hvor den ved hjælp af drej, vendinger og retningskift forsøger at slippe af med sin fjende.

Lille lappedykker

Latinsk navn: *Tachybaptus ruficollis*

Engelsk navn: Little grebe

Klasse: Fugle

Orden: Lappedykkere

Familie: Lappedykkere



Lille lappedykker er almindelig i Danmark, hvor den kan ses året rundt, men den findes især i store antal om vinteren. Om vinteren lever fuglene alene eller i småflokke ved kyster, fjorde og havne. Nogle lappedykkere trækker sydpå om efteråret.

Kendetegn

Den lille lappedykker har pjuskede fjer og et kort næb med lysegule mundvige. I yngletiden er lappedykkeren sortbrun med rødbrune kinder og hals samt hvidgrå bug med pletter. Om vinteren er fuglen gråbrun på oversiden og lysebrun på undersiden, halsen og kinder.

Føde

Lappedykkeren lever især af vandinsekter og deres laver samt krebsdyr, små bløddyr og småfisk. Den dykker efter føden.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 40-45 cm
Længde: 23-29 cm
Vægt: 100-200 g
Maks. levealder: 13 år
Kuldstørrelse: 3-6 æg
Antal kuld: 2-3
Rugetid: 20 dage
Ungetid: 44-48 dage

Vidste du det?

I yngletiden lever den lille lappedykker ret skjult ved små, lavvandede vandhuller, moser og søer med mange planter. Reden flyder på vandet og er fæstnet til vandplanter. Begge forældre varmer de små unger under vingerne i den første tid.

Pibeand

Latinsk navn: *Anas penelope*

Engelsk navn: Eurasian Wigeon

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder



Pibeanden er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, men den er en almindelig trækfugl og meget talrig vintergæst. Pibeænderne er vandfugle, der lever ved lavvandede kyster, på strandenge og marsken samt i andre vådområder. I træktiden er der desuden rigtig store flokke af pibeænder samlet i Vadehavet.

Kendetegn

I yngletiden har hannen rødbrunt hoved og hals samt gullig pande eller blis og grårosa bryst. Oversiden er grå, bugen er hvid og forvingerne er ligeledes hvide. Rumpen er sort med hvidt felt. Hunnen er brunlig med hvid bug. Begge køn har blågråt næb med sort spids.

Føde

Pibeanden lever hovedsageligt af vandplanter, græsser og planterødder samt på træk også vinterafgrøder, som anden finder på dyrkede marker.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 75-86 cm
Længde: 46 cm
Vægt (han): 700-900 g
Vægt (hun): 500-850 g
Maks. levealder: 34 år
Kuldstørrelse: 8-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-25 dage
Ungetid: 40-45 dage

Vidste du det?

Trækket af pibeænder kommer til Danmark i august-september. De bliver i landet hele efteråret. Nogle af fuglene trækker så videre til andre europæiske lande for at overvinde, men en stor del vælger dog at blive i Danmark. Helt op til 75.000 ænder overvintrer herhjemme, og de forlader først landet til foråret.

Rødstrubet lom


Latinsk navn: *Gavia stellata*

Engelsk navn: Red-throated loon

Klasse: Fugle

Orden: Lommer

Familie: Lommer



Rødstrubet lom er ret almindelig i Danmark, hvor den kan ses hele året, især som træk- og vintergæst. Trækket af fugle kommer til landet i september-oktober og forlader os igen til foråret. Ca. 100.000 lommer overvintrer hvert år i danske farvande, især vestpå. Lommen ses om sommeren, men den yngler ikke i landet.

Kendetegn

Den rødstrubede lom har en langstrakt krop med et tyndt næb, der er en smule opadbøjet. I yngledragten kan lommen især kendes på den karakteristiske rød-brune strube samt det grå hoved og hals med sort-hvide striber. Oversiden er brunlig med lyse pletter, og bugen er lys. Om vinteren har fuglen en grå overside med lyse pletter og en hvid bug. Kønnene er ens.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 106-116 cm
Længde: 50-69 cm
Vægt (han): 1750 g
Vægt (hun): 1550 g
Maks. levealder: 23 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage
Ungetid: 43 dage

Føde

Rødstrubet lom lever af især fisk, men de tager også krebsdyr, muslinger, snegle og orme.

Vidste du det?

Rødstrubet lom er en meget dygtig svømmefugl, der dykker ned under vandet for at finde føde. Når lommen dykker, kan den blive under vandet i op til et par minutter. Om vinteren lever de rødstrubede lommer ofte i småflokke på 10-30 meters dybde ude på havet, eller langs kysterne på lidt lavere vand.



Sangsvane

Latinsk navn: *Cygnus cygnus*

Engelsk navn: Whooper swan

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder

Sangsvanen er en trækfugl, der overvintrer i Danmark. Sangsvanerne kommer til Danmark nordfra i oktober og trækker bort igen i april. Ganske få par yngler i Danmark. Dette sker om sommeren ved uforstyrrede søer og moser. Om vinteren lever sangsvanerne i større flokke på marker, ved lavvandede kyster, fjorde, søer eller åer.

Kendetegn

Sangsvanen har en hvid fjerdragt samt et sort og gult næb, der er karakteristisk for netop sangsvanen. Fuglen holder sin hals strakt fremfor i s-form. Svanen har desuden et kraftigt og klangfuldt kald.

Føde

Sangsvanens føde består af græs, frø og vinterafgrøder fra marker samt vandplanter.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 218-243 cm
Længde: 145-160 cm
Vægt (han): 10-11 kg
Vægt (hun): 8-9 kg
Maks. levealder: 26 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35 dage
Ungetid: 78-96 dage

Vidste du det?

Om vinteren kan der forekomme mellem 15.000 og 23.000 sangsvaner, der lever sammen i flokke, her i landet. Der er dog kun registreret ca. 3 ynglepar. Det ene af disse par har fået 8 unger.



Sortand

Latinsk navn: **Melanitta nigra**
Engelsk navn: **Common Scoter**
Klasse: **Fugle**
Orden: **Andefugle**
Familie: **Svaner, gæs og ænder**



Sortanden er en meget almindeligt træk- og vintergæst i september-maj. Omkring en halv million sorttænder overvintrer i danske farvande – især i Kattegat og i Vadehavet. Ænderne lever langs kysterne eller ude på havet, hvor der højst er 20 meter dybt. Ænderne foretrækker ofte havområder med lavvandede sandbunker, hvor de dykker efter føde.

Kendetegn

Sortanden er som navnet siger sort. Hunnen er dog mørkebrun med lyse kinder og hals samt mørk kalot og brunt næb. Hannens næb er sort med en tydelig trekantet, gul plet foran en pukkel øverst på næbbet. Sorttænder optræder normalt i meget store flokke på over 1.000 fugle.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 70-90 cm
Længde: 44-54 cm
Vægt (han): 1300-1450 g
Vægt (hun): 1200-1300 g
Maks. levealder: 16 år
Kuld størrelse: 6-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-31 dage
Ungetid: 45-50 dage
Ungetid: 57-66 dage

Føde

Sorttænder lever hovedsageligt af muslinger, krebsdyr, snegle og orme.

Vidste du det?

I Danmark optræder sorttænderne især i store antal om vinteren, men de findes dog også i landet om sommeren, hvor sorttænderne bl.a. fælder deres fjer i store flokke i Vadehavet i juni-august. Ænderne yngler dog ikke i Danmark, men længere nordpå i fjelde og tundraområder.

Taffeland

Latinsk navn: *Aythya ferina*

Engelsk navn: Common pochard

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder



Taffelanden forekommer hele året, enten som almindelig vintergæst nordfra eller som trækgæst i april-september. Taffelanden lever i fjorde og lavvandede kyster. Taffelænderne yngler ofte ved større søer eller moser. Lever af og til i kolonier med hættemåger.

Kendetegn

Hannen har i yngledragt et rødbrunt hoved samt sort bryst og bagparti. Kroppen er grålig. Næbbet er sort med et gråt tværbånd. Hunnen er gråbrun, men har ellers det samme mønster som hannen.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 67-82 cm
Længde: 42-49 cm
Vægt: 700-1100 g
Maks. levealder: 23 år
Kuldstørrelse: 8-10 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 50-55 dage

Føde

Taffelandens føde består af vandplanter, muslinger, snegle, småfisk og krebsdyr. Ungerne fodres især med insektlarver. Dykker eller snadrer i vandoverfladen efter føden.

Vidste du det?

Uden for yngletiden raster taffelanden ligesom troldanden på vandet om dagen. Først om natten søger den føde. Taffelanden er en dykand, men den dykker kun et par meter. Taffelanden foretrækker derfor at søge føde på lavt vand.

Toppet lappedykker

Latinsk navn: **Podiceps cristatus**
Engelsk navn: **Great crested grebe**
Klasse: **Fugle**
Orden: **Lappedykkere**
Familie: **Lappedykkere**



Toppet lappedykker er almindeligt udbredt i hele Danmark året rundt. Nogle som standfugle, der overvintrer i landet, andre kun som trækgæster. Toppet lappedykker lever ved større søer samt åløb med en kraftig plantevækst på bredden. Den forekommer ligeledes i fjorde.

Kendetegn

Toppet lappedykker er den største af de danske lappedykkere og i yngledragten er den let genkendelig på de lange, sorte fjerører. Issen er sort. Oversiden er grå-brun, mens underside, hals, strube og kinder er hvide. Kindfjerene er orange.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 46-71 cm
Længde: 45-51 cm
Vægt: 750-1200 g
Maks. levealder: 19 år
Kuld størrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28 dage
Ungetid: 71-79 dage

Føde

Lappedykkeren lever især af småfisk men den tager også frøer, krebsdyr og vandinsekter, og den spiser vandplanter.

Vidste du det?

Toppet lappedykkerne bygger rede ved søbredden. Reden er flydende og oversvømmes derfor ikke. Ungerne passes efter udklækningen af begge forældre, som tit ses svømme rundt med ungerne på ryggen. På den måde kan ungerne holde sig varme.



Troldand

Latinsk navn: *Aythya fuligula*

Engelsk navn: Tufted duck

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder



Troldanden ses hele året i Danmark som træk- og vintergæst. Troldænderne yngler i næringsrige søer og moser – gerne i kolonier med hættemåger. Generelt lever troldanden i flok i større søer, åer og ved lavvandede kyster.

Kendetegn

I yngletiden har hannen en lang nakketop. Fjerdragten er sort med hvide sider. Bugen er også hvid. Hunnen er mørkebrun med lysere sider og bug. Nakketoppen er mindre hos hunnen. Begge køn har hvidt vingespejl, gule øjne og blågråt næb med sort spids.

Føde

Troldanden lever i sær af muslinger, som den finder ved at dykke. Derudover tager anden også snegle, orme, vandinsekter samt frø fra vandplanter.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 65-73 cm
Længde: 40-47 cm
Vægt: 550-900 g
Maks. levealder: 22 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25 dage
Ungetid: 45-50 dage
Ungetid: 57-66 dage

Vidste du det?

Troldænder er meget inaktive om dagen. Først om natten søger de føde. Pladserne, hvor troldænderne hviler om dagen, kan godt ligge langt fra stederne, hvor de søger føde.