

Dobbeltbekkasin

Latinsk navn: *Bucephala clangula*
Engelsk navn: Common goldeneye
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle



Dobbeltbekkasinen er en trækfugl, der ankommer til Danmark i marts og trækker bort igen i november. Den overvintrer i Vesteuropa eller Nordvestafrika. Dobbeltbekkasinen er almindelig i hele landet, men den yngler helst i fugtige områder som enge eller ved søer og moser. Rederne skjules i fordybninger i græs.

Kendetegn

Dobbeltbekkasinen er en vadefugl med et meget langt næb, der udgør 1/3 af den samlede længde. Fjerdragten er brunlig med gyldne, lyse striber på ryggen, og halen er afrundet. De yderste halefjer er lyse.

Føde

Det meget lange næb anvendes til at finde føde i jorden. Føden består mest af regnorme, biller, snegle og insekter.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Vingefang: 37-47 cm
Længde: 27 cm
Vægt: 80-120 g
Maks. levealder: 16 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 18-20 dage
Ungetid: 19-20 dage

Vidste du det?

Dobbeltbekkasinen er svær at få øje på i naturen, fordi den kan skjule sig godt i omgivelserne. Under parringsflugten dykker dobbeltbekkasinen med så høj fart, at det sætter de yderste halefjer svingninger. Disse svingninger frembringer en lyd, der lyder som en fjern trommen.

Almindelig ryle


Latinsk navn: *Calidris alpina*

Engelsk navn: **Dunlin**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Snepefugle**



Almindelig ryle er en almindelig trækgæst, der kan ses ved de danske kyster og især i Vadehavet forår-efterår. Enkelte ryler overvintrer i Danmark. Rylerne lever ved lavvandede kyster, på fugtige strandenge eller på åbne vade-flader. Kun få par yngler i Danmark. Til gengæld er rylen, den mest almindelige vadefugl herhjemme.

Kendetegn

Den almindelige ryle er en lille fugl med et langt, sort næb. Rylen er gråbrun på oversiden og hvid på undersiden. I yngledragten har fuglen en mere gyldenbrun overside med mørke pletter samt et mørkt bugskjold på undersiden.

Føde

Almindelig ryle lever af forskellige smådyr som insekter, bløddyr, krebsdyr, orme og larver.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 32-40 cm
Længde: 17-21 cm
Vægt: 40-50 g
Maks. levealder: 28 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 19-21 dage

Vidste du det?

Den almindelige ryle søger føde på vade-flader, i strandkanter eller på sand- og mudderbanker, hvor fuglen borer sit næb 1-2 cm ned i bunden. Rylerne søger normalt efter føde i flokke på flere tusinde fugle.



Klyde

Latinsk navn: *Recurvirostra avosetta*

Engelsk navn: **Pied avocet**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Klyder og stylteløbere**


Klyden er en almindelig træk- og ynglefugl, der kommer til Danmark i marts og trækker bort igen til august/november. Klyderne yngler i små kolonier ved lavvandede kyster, på strandenge med kort græs samt på småøer og revler. Klyden svømmer ganske godt.

Kendetegn

Klyden er en slank og langbenet vadefugl med en kontrastrig fjerdrag. Fuglen er hvid med sort nakke og isse og sorte aftegninger på vingerne og halen. Benene er lyseblå, mens det lange næb er sort og kraftigt opadbøjet. Hannen og hunnen er ens.

Føde

Klyden lever af små krebsdyr, børsteorme, insekter og larver, som den finder på lavt vand.



Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 77-80 cm
Længde: 42-45 cm
Vægt: 250-400 g
Max levealder: 27 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 25 dage



Vidste du det?

Sidst på sommeren samles klyderne i store flokke i Vadehavet for at raste, inden de trækker sydpå, hvilket sker sidst på efteråret i oktober-november. Fuglene overvintrer i Sydeuropa.

Sandløber


Latinsk navn: *Calidris alba*

Engelsk navn: **Sanderling**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Snepefugle**



Sandløberen er ret almindelig som trækgæst i juli-september og marts-juni ved de fleste danske kyster og sandstrande, dog især ved den jyske vestkyst og i Vadehavet. Sandløbere optræder også i Danmark både vinter og sommer, men de yngler dog ikke i landet. På trækket optræder fuglene ofte i store flokke.

Kendetegn

I yngletiden er sandløberen rødbrun og plettet med hvid underside og gullig ring omkring næbbet. Om vinteren er fuglene helt hvide med plettet, lysegrå overside samt sorte vingefjer. Sandløberen ligner den almindelige ryle, men har et kortere og mere lige, mørkt næb. Desuden har fuglen hvide vingebånd og sorte ben.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 36-39 cm
Længde: 18-21 cm
Vægt: 45-85 g
Maks. levealder: 18 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 24-27 dage
Ungetid: 23-24 dage

Føde

Sandløberen lever af forskellige smådyr som insekter, larver, orme, krebsdyr og bløddyr.

Vidste du det?

Sandløberen har fået sit navn, fordi den finder føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgeslagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamler det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet. Fuglen kan dog også finde føde længere oppe på stranden.

Rødben

Latinsk navn: **Tringa totanus**

Engelsk navn: **Common redshank**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Brokfugle**

I Danmark findes både **nordlige og sydlige rødben**. De nordlige overvintrer i Danmark, mens de sydlige ankommer i marts og trækker væk igen til oktober. Rødben lever og yngler på enge langs søer og vandløb, ved moser samt på vadeblader ved kysten. De søger føde i mudder og på lavt vand.

Kendetegn

Rødben har fået navn efter de lange orange-røde ben. Fuglen har en gråbrun ryg med mørke pletter samt en hvid underside. Det lige næb er sort og rødt. I yngletiden er rødbenens fjerdragt mørkere og med striber på undersiden. Når rødben flyver kan man desuden se de hvide vingekanter.



Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 45-52 cm
Længde: 27-29 cm
Vægt (han): 85-140 g
Vægt (hun): 110-155 g
Maks. levealder: 26 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24 dage
Ungetid: 25-35 dage

Føde

Rødben tager især orme, muslinger, små krebsdyr og insekter.

Vidste du det?

Rødbenen er en meget nervøs fugl, der er hurtig til at lette, hvis den bliver forstyrret eller føler sig truet. Samtidig med, at den er hurtig til at lette, udstøder den også høje og kraftige advarselsslyde.

Mudderklire


Latinsk navn: *Actitis hypoleucos*

Engelsk navn: Common sandpiper

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Mudderklire er en trækfugl. Den kan ses i Danmark i perioden april-september. Holder til ved stenede søer, vandløb, åbredder og kyster. Mudderklires yngler kun sjældent her i landet. Rederne bygges som små fordybninger i sand eller grus.

Kendetegn

Mudderklire har en gråbrun overside, bryst og hoved. Undersiden er hvid. Benene er korte og grønne. Næbbet er lige og forholdsvis langt. Når mudderklires flyver, kan man se de hvide vingebånd.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 32-35 cm
Længde: 18-20 cm
Vægt: 40-60 g
Maks. levealder: 14 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-4
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 18-21 dage

Føde

Mudderklires føde består hovedsagelig af insekter og hvirvelløse smådyr som snegle. Fuglen fanger insekter på land mellem sten og tang eller lavt i luften.

Vidste du det?

Mudderklires overvintrer i Afrika, hvor man bl.a. har observeret den, mens den sidder på ryggen af flodheste eller krokodiller.

Sortklire

Latinsk navn: *Tringa erythropus*

Engelsk navn: **Spotted redshank**

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Sortkliren er almindelig som trækfugl i Danmark. Den kan ses på træk i april-maj, hvor fuglene også fælder deres fjer, og igen i juni-november. Fuglen lever på lavvandede vadeblader langs kysterne. Rigtig mange fugle raster desuden i Vadehavet. Sortkliren yngler ikke i Danmark, men nordpå i andre skandinaviske lande samt Rusland og Sibirien.

Kendetegn

I yngledragten er sortkliren helt sort med hvidlige pletter på oversiden samt hvid gump og hale. Om vinteren er fuglen mere lysegrå med hvid underside. Sortkliren har rødlige ben og et spinkelt, langt rødt og sort næb.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 48-67 cm
Længde: 29-32 cm (heraf udgør næbbet ca. 5-6 cm)
Vægt (han): 135-170 g
Vægt (hun): 160-205 g
Maks. levealder: 8 år
Kuld størrelse: 3-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: ca. 22-25 dage
Ungetid: ?

Føde

Sortkliren er en svømmefugl, der lever af vandinsekter, krebsdyr, bløddyr, orme, frøer, haletudser og småfisk, som den finder på lavt vand eller i mudderbunden.

Vidste du det?

Sortkliren yngler nordpå i skov- områder med fugtige højmoser, hvor reden er en fordybning i jorden eller på en tue. Reden fores med plantedele. Alt tyder på, at hunnen kun bliver ved reden de første par dage efter æggene er lagt. Herefter er det hannen, der udruger æggene og passer og fodrer ungerne.



Stor kobbersneppe

Latinsk navn: *Limosa limosa*

Engelsk navn: Black-tailed godwit

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Stor kobbersneppe er en ret fåtallig yngle- og trækfugl i Danmark fra marts til august-oktober. Enkelte fugle overvintrer i landet, men størstedelen træk-

ker til Vestafrika. Kobbersneppen findes især i den nordvestlige del af Jylland på mudderflader og ved Vadehavets kyster. Den yngler især på strandenge og i marskområder.

Kendetegn

Den store kobbersneppe har et meget langt, lige næb og lange, mørke ben. I yngletiden er fuglen kobberød på brystet, hovedet og halsen. Om vinteren er den gråbrun med hvid bug. Derudover har sneppefuglen hvide vingebånd og sort halebånd.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 62-70 cm
Længde: 37-44 cm (heraf udgør næbbet ca. 8-11 cm)
Vægt (han): 280-400 g
Vægt (hun): 300-500 g
Maks. levealder: 23 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage
Ungetid: 25-30 dage

Føde

Stor kobbersneppe finder føde på lavt vand ved at bore sit næb ned i mudderet. Føden består af orme, insekter, krebsdyr, snegle og muslinger.

Vidste du det?

De store kobbersnepper er ofte meget larmende på deres ynglepladser, hvor de enlige hanner udfører en særlig paringsflugt. Den består af gentagne styrtdyk fra store højder eller vippen-de bevægelser fra side til side, mens han udstøder høje kald.

Skovsneppe


Latinsk navn: *Scolopax rusticola*

Engelsk navn: Woodcock

Klasse: Fugle

Orden: Vadefugl

Familie: Sneppefugle



Skovsnuppen er egentlig en vadefugl, som kan sammenlignes med vadefugle ved sø og hav, men den har tilpasset sig livet i fugtige skove, hvor den finder føde nær vandhuller, bække og kilder.

Kendetegn

Skovsnuppen kendes især på sine meget lave ben, der får den buttede fugl til at se ekstra tung ud. Desuden er det lange, spidse næb meget karakteristisk for skovsnuppen. De mørke, brune, spættede farver i fjerdragten får skovsnuppen til at falde godt sammen med skovbunden, og skovsnuppen kan derfor være vanskelig at få øje på.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Sø og vandløb
Vingefang: 55-65 cm
Længde: 34 cm
Vægt: 250-420 g
Maks. levealder: 15 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22 dage
Ungetid: 15-20 dage

Føde

Skovsnuppen går rundt i skovbunden på jagt efter orme og insekter, som den fanger med sit lange, spidse næb.

Vidste du det?

Skovsnuppen er et vigtigt byttedyr for jægerne. Den er fredet for jagt om foråret, men alligevel nedlægges op til 40.000 skovsnupper om året.

Hjejle


Latinsk navn: *Pluvialis apricaria*

Engelsk navn: Eurasian golden plover

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Brokfugle



Hjejlen er en almindelig trækgæst, der kan ses i perioden marts-november. Hjejler forekommer i store, tætte flokke på marker og enge nær ved kysterne. De kan ses i kystområderne overalt i landet i trækperioden.

Kendetegn

Hjej lens yngledragt har en sort underside med en hvid kant. Oversiden er sort-brun med gule pletter. I vinterdragten mister hjejlen den sorte farve på bugen, som bliver hvid med et gyldent skær.

Føde

Hjej lens føde består af insekter, orme og edderkopper, som den piller op af jorden. Hjejlen spiser også bær og frø.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,
Kyst og hav
Vingefang: 67-76 cm
Længde: 25-29 cm
Vægt: 140-210 g
Max levealder: 12 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 25-33 dage

Vidste du det?

Hjejlen var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark. Men på grund af opdyrkningen af især de danske heder, er hjejlen nu sjælden som ynglefugl i Danmark. De få ynglende hjejler holder til i klitområder eller reservater.

Stor præstekrave


Latinsk navn: *Charadrius hiaticula*

Engelsk navn: Ringed plover

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Brokfugle



Stor præstekrave er en almindelig yngle- og trækfugl overalt i Danmark i perioden februar-oktober. Fuglen lever ved kyster på strandenge og på andre uforstyrrede vadeblader. De store præstekraver søger føde alene og ses sjældent i flokke. Få præstekraver overvintrer i Danmark.

Kendetegn

Den store præstekrave har et kort, gult næb med sort spids, gule ben samt ret store øjne. Fuglen har en gråbrun overside og hvid underside med sort brystbånd og hvid halskrave. Fuglens pande er hvid med to sorte bånd.

Føde

Stor præstekrave lever af insekter, orme, krebs- dyr – især tanglopper, muslinger og snegle. Den søger føde ved skiftevis at løbe lidt, standse op, lede efter mad og løbe videre.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 48-57 cm
Længde: ca. 19 cm
Vægt: 55-75 g
Maks. levealder: 20 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-3
Rugetid: 23-25 dage
Ungetid: 24 dage

Vidste du det?

Den store præstekrave yngler ved kyster med sand, grus, mudder og sten. Som noget meget særegent kan stor præstekrave aflede opmærksomheden fra sine æg eller unger ved at spille syg og derved beskytte æg og unger mod fjender.

Brushane


Latinsk navn: *Philomachus pugnax*

Engelsk navn: ♂ Ruff, ♀ Reeve

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Brushanen er en almindelig trækgæst i Danmark forår-efterår, hvor den kan ses på fugtige enge og marker samt ved lavvandede kyster og søbredder. Brushanen optræder ofte i flokke med andre brushaner eller hjejler. Kun få fugle yngler eller overvintrer i Danmark.

Kendetegn

I yngledragten har hannen en stor fjerkrave og to fjerører. Hannens bryst er sort, bugen er hvid, mens ryggen er brun med mørkere pletter. På næbbet har hannen små vorter. Hunnen er brun med pletter og hvid bug. Om vinteren er begge køn mere grå og lysere i fjerdragten.

Føde

Brushanen spiser orme, små bløddyr, insekter og plantefrø, som den finder på marker og enge eller på lavt vand. Den søger føde med næbbet stukket ned i mudderbunden.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 46-58 cm
Længde (han): 29 cm
Længde (hun): 23 cm
Vægt: 70-230 g
Max levealder: 13 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 20-23 dage
Ungetid: 25-28 dage

Vidste du det?

I yngletiden samles hannerne med oppustede halskraver og fjerører og udfører danse, hvor de truer og angriber hinanden. Vinderen parrer sig med hunnen, der efterfølgende flyver væk og tager sig af æggene. Herefter fortsætter hannerne deres danse, og nye hunner kommer til.