

# Almindelig albueskæl

**Grønlandsk navn:** Tattaasat

**Latinsk navn:** Patella vulgata

**Engelsk navn:** Common Limpet

**Klasse:** Bløddyr

**Orden:** Archaeogastropoda

**Familie:** Patellidae



Almindelig albueskæl lever i stærk brænding på sten- og klippekyster fra højvandslinjen og ud til få meters dybde. Hvert individ er både han og hun. Albueskæl bliver kønsmodne som hanner efter 9-12 måneder. Efter et par år ændrer de køn til hunner.

## Kendetegn

Skallen er hueformet og mat grålig-brunlig med gulligt skær og tydelige, radiære striber. Indersiden af skallen er brunlig-grågrøn, og foden er muskuløs og grågul.

## Føde

Albueskæl lever af alger, som de rasper af sten og klipper.

### Fakta

Levested: Hav

Længde: 5-6 cm

Højde: 2,5-3 cm

Æg og sperm gydes om vinteren

Albueskæl er hermafrodit

Larven lever i de frie vandmasser i 1-3 uger

Levealder: 3-15 år

### Vidste du det?

Hos albueskæl har hver snegl sin egen faste plads på en sten eller klippeblok, hvor skallens form er nøjagtigt tilpasset overfladen. Under fødesøgningen forlader sneglen sin plads, men den vender altid tilbage til samme sted. Sneglen suger sig fast til underlaget med foden.