

Konksnegl

Grønlandsk navn: Siuterorsuaq

Latinsk navn: Buccinum undatum

Engelsk navn: Common Whelk

Klasse: Bløddyr

Orden: Neogastropoda

Familie: Konkyliesnegle


Konksnegl eller almindelig konk lever i havet på alle bundtyper fra få meter og ned til 1.200 meters dybde.

Kendetegn

Skallen er spiralsnoet og grålig eller rødbrun med 7-8 vindinger, lilla markeringer og radiære, bulede ribber, der går på tværs af snoningen. Kroppen er hvidlig med sorte pletter. Konksnegle har ånderør og en lang udskydelig snabel, hvor raspetungen sidder på spidsen.

Føde

Konken er et rovdyr, der æder orme, krabber, muslinger, ådsler og skadede fisk, som er fanget i garn.



Fakta

Levested: Hav

Længde: Op til 10 cm

Bredde: Op til 6 cm

Ægkapsler

Vidste du det?

Hunner af konksnegle lægger store, gullighvide klumper af ægkapsler. Hver klump kan bestå af op mod 15.000 ægkapsler (fra flere hunner) med 500-3000 æg i hver. Af hver ægkapsel udvikles der dog kun få larver. De første klækkede larver æder de øvrige æg.