


# Almindelig stenbider

**Grønlandsk navn:** Nipisa  
**Latinsk navn:** Cyclopterus lumpus  
**Engelsk navn:** Lump sucker; Lumpfish  
**Klasse:** Fisk  
**Orden:** Ulkefisk  
**Familie:** Stenbiderfamilien



Almindelig stenbider forekommer talrigt i Grønland, hvor den lever i farvandedene syd for Uummannaq i vest og syd for Ammassalik i øst. Fisken foretrækker hård, stenet bund, og den lever uden for gydetiden pelagisk på dybt vand.

## Kendetegn

Hunnen er mørk grålig eller grønlig med lys bug, hvorimod hannen er gråbrun med hvid bug, der dog er rødlig i gydeperioden. Stenbideren har en høj ryg og en kort, plump krop med syv rækker benknuder. Bugfinnerne er vokset sammen til en sugeskive, og den forreste rygfinne er dækket af en benkam.

## Føde

Stenbideren lever af plankton, småfisk, fiskeyngel, gopler, orme og krebsdyr.

### Fakta

Levested: Hav  
Længde (han/Angusalluk): Op til 40 cm  
Længde (hun/Arnarluk): Op til 70 cm  
Vægt: Op til ca. 5 kg  
Æg: Ca. 100.000-350.000  
Gyder: Januar-maj

### Vidste du det?

Stenbideren gyder på lavt vand, hvor hunnen afsætter sine rødgyldne æg i en stor klump på sten eller tang. Herefter vogter hannen over æggene, indtil de klækkes efter 7-8 uger. Stenbiderens rogn sælges ofte som kaviar.