

Almindelig ulk

Grønlandsk navn: Kanajoq
Latinsk navn: Myoxocephalus scorpius
Engelsk navn: Shorthorn Sculpin
Klasse: Fisk
Orden: Ulkefisk
Familie: Ulke



Almindelig ulk lever i Grønland på lavt vand ud til ca. 200 meters dybde på sand-, mudder- eller stenbund. Den er udbredt i V- og Ø- Grønland nordover til Inglefield Land og Peary Land. Ulken spises i Grønland.

Kendetegn

Almindelig ulk har et stort, bredt hoved med en meget stor mund samt pigge og benknuder. Den har desuden meget kraftige pigstråler i finnerne. Ulken har lyse pletter på undersiden, men farven varierer en del. I parringstiden bliver hannens bug dog rødlig.

Føde

Ulke er nærmest altædende, men de tager især krebsdyr, fisk samt fiskeæg og fiskeyngel.

Fakta

Levested: Hav
Længde: Op til 60 cm
Æg: Op til 2500-3000
Cyder: Vinter-forår
Kønsmoden efter 2-3 år

Vidste du det?

Almindelig ulk parrer sig om vinteren. Hannen holder hunnen fast, mens parringen foregår. Hunnen lægger efterfølgende sine æg i klumper på havbunden på lavt vand. Hannen vogter over æggene, indtil de klækkes efter ca. 5 uger.