Blåhvilling (Sortmund)

Grønlandsk navn: Saarullernaq
Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Engelsk navn: Blue Whiting
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk



Blåhvilling er udbredt i det sydlige Grønland, hvor den lever pelagisk i store stimer ned til 3.000 meters dybde, dog oftest på 100-400 m dybt vand. Fisken er almindelig udbredt i Nordøstatlanten fra Svalbard til Marokko, i det vestlige Middelhav og langs V-Europas kyster.

Kendetegn

Blåhvilling er lang, slank og blank med et blåviolet skær. Den har underbid, tre rygfinner, lang forreste gatfinne og en mørk sidelinie, der sidder højt oppe. Blåhvilling har desuden sort gælle- og mundhule, hvorfor den også kaldes sortmund.

Føde

Føden består af dyreplankton, blæksprutter og småfisk.

Fakta
Levested: Hav
Længde: Op til 50 cm
Vægt: Op til 2 kg
Gyder: Marts-maj
Bliver kønsmoden efter 1-2 år
Maks. levealder: 20 år

Vidste du det?
Blåhvilling vandrer mellem vandlagene i løbet af døgnet. Om dagen opholder den sig normalt ved bunden eller i de nedre vandlag, mens den findes i de øvre vandlag nær overfladen om natten.

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2025 Jørgen Steen, Naturporten.dk · StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne