

# Almindelig kjove

**Grønlandsk navn:** Isunngaq

**Latinsk navn:** Stercorarius parasiticus

**Engelsk navn:** Arctic Skua; Parasitic Jaeger

**Klasse:** Fugle

**Orden:** Mågevadefugle

**Familie:** Kjoever

Almindelig kjove er en almindelig yngle- og trækfugl ved V-Grønlands kyster. Ynglende fugle optræder også spredt ved Ø-Grønlands kyster fra Scoresbysund til Hochstetter Forland. Almindelig kjove kan ses i Grønland fra maj-september.



## Kendetegn

Almindelige kjove har hvide felter i vingerne og forlængede halefjer. Den findes i både i en lys og en mørk variant. Den mørke er helt gråbrun med en sort isse, mens den lyse har hvid underside og strube.

## Føde

Almindelig kjove lever af fisk, æg, fugleunger, insekter, bær og andre plantedele.

### Fakta

Levested: Kyst og hav  
Forekomst: Almindelig  
Vingefang: 100-125 cm  
Længde: 37-52 cm  
Vægt: 300-600 g  
Maks. levealder: 31 år  
Kuld størrelse: 2 æg  
Antal kuld: 1 pr. år  
Rugetid: 25-28 dage  
Ungetid: 25-30 dage

### Vidste du det?

Almindelig kjove yngler som regel i kystområder med rider, måger og ternere, som den ofte stjæler mad fra. Almindelig kjove frarøver de andre havfugle deres bytte ved at forfølge dem i luften og angribe.