

# Almindelig ryle

**Grønlandsk navn:** Saarfaarsorlak

**Latinsk navn:** Calidris alpina

**Engelsk navn:** Dunlin

**Klasse:** Fugle

**Orden:** Mågevadefugle

**Familie:** Sneppefugle



I Grønland forekommer der tre bestande af almindelig ryle. I NØ-Grønland yngler den arktiske form, i SØ-Grønland findes den islandske form, og i V-Grønland ses ryler fra den amerikanske bestand. Almindelig ryle lever ved kysten og yngler i fugtige områder og kær. Fuglen kan ses i Grønland fra maj til august.

## Kendetegn

Almindelig ryle er en lille fugl med kort hals og et langt, nedadbuget, sort næb. Rylen er gråbrun på oversiden og hvid på undersiden. I yngledragten har fuglen dog et mørkt bugskjold, en mere sortbrun ryg og et sortplettet bryst.

## Føde

Almindelig ryle lever af insekter og forskellige smådyr som krebsdyr, orme og snegle.

### Fakta

Levested: Kyst og hav  
Forekomst: Almindelig  
Vingefang: 28-45 cm  
Længde: 16-22 cm  
Vægt: 33-85 g  
Max. levealder: 29 år  
Kuld størrelse: 4 æg  
Antal kuld: 1 pr. år  
Rugetid: 20-24 dage  
Ungetid: 19-21 dage

### Vidste du det?

Almindelig ryle søger ofte føde på fugtige vade- og mudderflader, hvor fuglen borer sit lange næb 1-2 cm ned i bunden og trækker insekter og andre smådyr op.