

# Hedepiber

**Grønlandsk navn:** Kussattarnaq

**Latinsk navn:** Anthus petrosus

**Engelsk navn:** Rock Pipit

**Klasse:** Fugle

**Orden:** Spurvefugle

**Familie:** Pibere og

Vipstjerter

Hedepiber, som også kaldes skærpiber, yngler spredt i V-Grønland på klippekyster og skærgårde, hvor reden skjules i vegetationen eller i klipperevner. Fuglen forekommer desuden som en ret talrig trækgæst nær kysterne i maj og september.



## Kendetegn

Hedepiberen har sorte ben og en brunlig eller gråbrun fjerdragt, der er mørkest på oversiden. Desuden har skærpiberen spredte og ret diffuse pletter på undersiden, striber på oversiden, lys øjenring og en lys stribe over øjet.

## Føde

Hedepiber æder krebsdyr, muslinger og insekter, som de finder på jorden.

### Fakta

Levested: Kyst og hav og Fjeldet

Forekomst: Almindelig

Vingefang: 22,5-28 cm

Længde: 17 cm

Vægt: 21-30 g

Maks. levealder: 10 år

Kuldstørrelse: 4-5 æg

Antal kuld: 2 pr. år

Rugetid: 14 dage

Ungetid: 16 dage

### Vidste du det?

Man kan få det indtryk, at skærpiberen og hedepiberen er to forskellige fugle - det er dog ikke tilfældet. Der er tale om samme fugl, der blot har to forskellige danske navne.