


Mellemkjo ve

Grønlandsk navn: Isunngarsuaq
Latinsk navn: Stercorarius pomarinus
Engelsk navn: Pomarine Skua
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Kjo ver

Mellemkjo ve er en almindelig sommer- og trækgæst overalt i de grønlandske farvande i juni-oktober. Fuglen er dog mest almindelig i V-Grønland fra Nuuk til Uummannaq. Mellemkjo ven yngler ikke i Grønland.



Kendetegn

Mellemkjo ven har forlængede midterste halefjer, der er snoede og kølleformede. Derudover kan den kendes på de lyse vingefelter. Mellemkjo ven findes både i en lys og en mørk form.

Føde

I yngletiden æder mellemkjo verne, som lever i NØ-Grønland, lemminger, mens de uden for yngletiden lever af fisk, som de ofte stjæler fra andre havfugle.

Fakta

Levested: Kyst og hav
Almindelig
Vingefang: 113-130 cm
Længde: 48-51 cm
Vægt: 550-900 g
Maks. levealder: ? år
Kuldstørrelse: oftest 2 æg
Antal kuld: 1 pr. år
Rugetid: 25-27 dage
Ungetid: 31-32 dage

Vidste du det?

Den lyse form af mellemkjo ven har mørk overside, mørkt brystbånd, sort hætte, hvid bug og hvidgult ansigt. Den mørke form er derimod ensfarvet og mørk - bortset fra de hvide vingefelter. Den lyse form er den mest almindelige.