

# Sabinemåge

**Grønlandsk navn:** Taateraarnaq

**Latinsk navn:** Xema sabini

**Engelsk navn:** Sabine's Gull

**Klasse:** Fugle

**Orden:** Mågevadefugle

**Familie:** Måger

Sabinemågen yngler spredt i N- og NØ-Grønland i juni-september og ses desuden som trækfugt i havet ud for V-Grønland i august-oktober. Mågen yngler ofte i kolonier med havterne på små øer, ved lave kyster og i fjorde.



## Kendetegn

Sabinemågen er hvid med et trekant-mønster på vingeoversiden, hvor den yderste del er sort, den midterste hvid og den inderste grå ligesom ryggen. Den har et sort næb med gul spids, og i yngledragten har den desuden en grå hætte, som er afgrænset af en sort halsring.

## Føde

Sabinemågens føde består af småfisk, krebsdyr og insekter, som den normalt snupper fra havoverfladen.

### Fakta

Levested: Kyst og hav  
Almindelig  
Vingefang: 80-100 cm  
Længde: 27-36 cm  
Vægt: 135-225 g  
Kuld størrelse: 2 æg  
Antal kuld: 1 pr. år  
Rugetid: 23-25 dage  
Ungetid: ? dage

### Vidste du det?

Sabinemågen har fået sit navn efter Edward Sabine, der var den første til at beskrive mågen på en polarekspedition ved Grønlands vestkyst i 1818.