

Sandløber

Grønlandsk navn: Siorarsiooq

Latinsk navn: Calidris alba

Engelsk navn: Sanderling

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Sandløber er en højarktisk art, der yngler i N- og NØ-Grønland på tørre fjeldheder eller ved kær. Sandløberen kan dog også ses i resten af Grønland ved kysterne på træk fra eller til vinterkvarteret i V-Afrika i maj-juni og juli-august.

Kendetegn

I yngledragt har sandløber gullig ring omkring næbbet samt en rødbrun overside med mørke pletter. Om vinteren er fuglen hvid med plettet, lysegrå overside og sorte vingefjer. Sandløberen har desuden hvide vingebånd, sorte ben samt et kort og helt lige, sort næb.

Føde

Sandløber lever af forskellige smådyr som insekter, larver, orme, krebsdyr og bløddyr.

Fakta

Levested: Kyst og hav
Almindelig
Vingefang: 35-45 cm
Længde: 18-22 cm
Vægt: 33-110 g
Max. levealder: 18 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2 pr. år
Rugetid: 24-32 dage
Ungetid: 23-24 dage

Vidste du det?

Sandløber finder ofte føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgeslagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamler det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet.