

Stenvender

Grønlandsk navn: Taliffak

Latinsk navn: Arenaria interpres

Engelsk navn: Ruddy Turnstone

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle

Stenvender er en almindelig ynglefugl i det højarktiske NØ- og N-Grønland. Derudover yngler fuglen også meget lokalt i V-Grønland på Disko. Fuglene ankommer til de grønlandske ynglesteder i maj og forlader dem til august. De overvintrer normalt i NV-Europa.

Kendetegn

I yngledragt er stenvenderen rødbrun og broget med sort bryst, hvid bug og sort-hvidt hoved. Fuglen har desuden et kort, sort næb og korte, orange ben.



Føde

Stenvenderen æder tanglopper, insekter, bløddyr, fiskerester og ådsler. Den finder føden ved at skubbe sten væk med næbbet.

Fakta

Levested: Fjeldet, Kyst og hav
Almindelig
Vingefang: 43-54 cm
Længde: 21-26 cm
Vægt: 80-190 g
Max. levealder: 21 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1 pr. år
Rugetid: 22-27 dage
Ungetid: 19-21 dage

Vidste du det?

I luften kan man kende stenvenderen på de tydelige sort-hvide tegninger på oversiden af fjerdragten. Fuglen har en hvid hale med sort bånd, markant hvid ryglinie, hvidt vingebånd samt smalle hvide tegninger mellem ryglinien og vingerne.