

Strandhjejle

Grønlandsk navn: Anngilik sissarmiu

Latinsk navn: Pluvialis squatarola

Engelsk navn: Grey Plover

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Brokfugle



Strandhjejle har enkelte gange ynglet i Disko Bugt-området og optræder desuden som en fåtallig trækgæst i tiden maj-september. Som trækgæst ses hjejlen normalt i V-Grønland i Disko Bugt-området og mellem Kap Farvel og Sisimiut.

Kendetegn

I yngledragten er strandhjejlen sort på brystet med et bredt, hvidt bånd langs hovedet og halsen. Oversiden er hvid- og sortplettet. Desuden kan strandhjejlen kendes på de sorte armhulefjer på de lyse vingeundersider. Om vinteren er fuglen grålig uden sort underside.

Føde

Strandhjejlen består af smådyr som insekter, muslinger, krebsdyr, orme og snegle.

Fakta

Levested: Kyst og hav
Almindelig
Vingefang: 56-83 cm
Længde: 27-30 cm
Vægt: 170-240 g
Maks. levealder: 25 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1 pr. år
Rugetid: 26-27 dage
Ungetid: 35-45 dage

Vidste du det?

Strandhjejler er ret territoriale på vadepladserne i overvintringskvarteret, og ringmærkning har vist, at fuglene ofte vender tilbage til det samme territorium vinter efter vinter.