

Inuitmåge (Thayers måge)

Grønlandsk navn: Naajavaaq

Latinsk navn: Larus thayeri

Engelsk navn: Thayer's Gull

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Måger

Inuitmåge, der også kaldes Thayers måge, yngler meget fåtalligt i NV-Grønland i Qaanaaq-området på stejle klippesider ved kysten. Derudover er mågen en sjælden gæst i V-Grønland. Den overvintrer normalt ved N-Amerikas kyster.



Kendetegn

Inuitmågen har hvid underside og hvidt hoved samt lysegrå overside. Derudover er vingespidserne sorte med enkelte hvide pletter. Næbbet er gult med rød plet på den nederste del.

Føde

Mågen lever af fisk, fugleæg, fugleunger, ådsler og andre smådyr, der ofte tages fra havoverfladen og ædes eller sluges i luften.

Fakta

Levested: Kyst og hav
Ses af og til
Vingefang: 140-150 cm
Længde: 52-60 cm
Vægt: ca. 1 kg
Maks. levealder: ? år
Kuldstørrelse: 1-4 æg
Antal kuld: 1 pr. år
Rugetid: ? dage
Ungetid: ? dage

Vidste du det?

Inuitmågen er en ret sjælden fugl - også i Europa. I 2005 blev der kun optalt 5 ynglefund, tre fra Irland, et fra Norge og et fra Danmark.