

Dansemyg

Grønlandsk navn: Ippernaq niviertartoq

Latinsk navn: Ablabesmyia pulchripennis

Engelsk navn: Chironomids (Non-biting midges)

Klasse: Insekter

Orden: Tovinger

Familie: Dansemyg


Dansemyg er meget talrige og dominerende i Arktis. Der findes over 100 arter i Grønland, hvoraf nogle er almindelige og vidt udbredte i V-Grønland. Dansemyggenes larver er et vigtigt fødegrundlag for mange fuglearter samt for fjeldørred.

Kendetegn

Dansemyg har en lang, slank bagkrop, en pukkel på brystet og ret korte vinger. Hannen har fjerbuskede antenner. Dansemyg optræder ofte i meget store sværme.

Føde

Voksne dansemyg lever ofte kun ganske få dage og tager ikke føde til sig. De har svagt udviklede munddele og stikker ikke.



Fakta

Levested: Fjeldet Ferskvand

Længde: 3-10 mm

Vingefang: ca. 15 mm

Parring: Forår-forsommer

Larvelængde: ca. 30 mm

Larvetid: Op til flere år

Puppetid: ca. 4-8 uger

Vidste du det?

Dansemyglarver er cylindriske og kan være røde, glasklare eller grønne. De lever på bunden af søer, elve og vandløb og æder alger, bakterier, andre myg-gelarver og andet organisk materiale. Larverne kan være flere år om deres udvikling. De forpupper sig om foråret.