

Lækat (Hermelin)

Grønlandsk navn: Ukaliatsiaq

Latinsk navn: Mustela erminea

Engelsk navn: Shorttailed Weasel; Ermine; Stoat

Klasse: Pattedyr

Orden: Rovdyr

Familie: Mårfamilien



Lækat, som også kaldes hermelin, er meget afhængig af lemminger, som er dens foretrukne føde. Derfor er lækatten udbredt i samme område som lemmingen, dvs. fra Washington Land nordover til Blossville-kysten.

Kendetegn

Om sommeren er lækatten rødbrun med gullig til hvid underside og sort hale-spids. Om vinteren er dyret derimod helt hvidt bortset fra den sorte hale-spids. Halen er ca. 10 cm lang.

Føde

Hermelinen lever foruden lemminger også af harekillinger, fugle og fugleæg.

Fakta

Levested: Fjeldet

Længde: 20-30 cm (uden halen)

Vægt: 80-90 g

Parring: tidligt om sommeren

Kuld størrelse: 5-8 unger

Antal kuld: 1

Drægtighed: 11 måneder

Vidste du det?

I Grønland lever hermelinen normalt i stenfyldt terræn, hvor den også bygger rede. Hermelinen kan ofte ses springe over og mellem sten, og den kan desuden rejse sig på bagbenene, for at kigge rundt, inden den hurtigt forsvinder igen.