

# Vågehval (Sildepisker)

**Grønlandsk navn:** Tikaagullik  
**Latinsk navn:** Balaenoptera acutorostrata  
**Engelsk navn:** Minke Whale; Piked Whale  
**Klasse:** Pattedyr  
**Orden:** Hvaler  
**Familie:** Finhvaler



Vågehvalen eller sildepiskeren er den almindeligste bardehval ved Grønland. Den er mest talrig i SV-Grønland, men forekommer nordpå til Qaanaaq. Hvalen ses mindre talrigt på østkysten. Vågehvalerne søger føde i de arktiske havområder fra foråret til tidlig vinter, hvor de vandrer sydpå.

## Kendetegn

Vågehvalen er den mindste af bardehvalerne. Ryggen er grå eller sort, og bugen er hvid med 30-70 bugfurer. Brystfinnerne er hvide på undersiden og har en hvid aftegning på oversiden. Vågehvalen springer ret ofte op i luften. Blåsten er ca. 1 m høj - den er lav og bred

## Føde

Føden består af plankton, krebsdyr og stimefisk.

### Fakta

Levested: Hav  
Længde: Op til 10 m  
Vægt: Op til 10 tons  
Dykkedybde: Ned til 500 m  
Neddykningstid: Op til 20 min  
Hastighed: Op til 60 km/t  
Kuld størrelse: 1 unge  
Antal kuld: 1 hvert år  
Drægtighed: 10-12 måneder

### Vidste du det?

Der findes over 1 million vågehvaler i verden. Dette gør vågehvalen til den mest almindelige og den mest udbredte bardehval. Den grønlandske bestand blev i 2007 beregnet til at omfatte mere end 16.600 dyr.